

Andermatt BioVet AG  
6144 Grossdietwil

# Gallo-Sec

Zur Bekämpfung der Roten Vogelmilbe  
in Geflügelställen

Pour la lutte contre le pou rouge dans  
le poulailler



## **de-CH Eigenschaften/Wirkungen**

Akarizid und Insektizid zur biologischen Bekämpfung von kriechendem Ungeziefer, vor allem der Roten Vogelmilbe (*Dermanyssus gallinae*) in Geflügelställen. Gallo-Sec ist ein Pulver und besteht aus amorpher Diatomeenerde (= Schalen fossiler Kieselalgen). Schädlinge wie z. B. die rote Vogelmilbe in der Geflügelhaltung, aber auch kriechendes Ungeziefer wie Asseln, Ameisen und sonstige Lästlinge stäuben sich als Folge ihrer Eigenaktivität selbst ein, bzw. werden bei der Anwendung eingestäubt. Der Wirkstoff führt zum Herauslösen von Kutikulafetten und zur Dehydrierung der Insekten.

## **Wirkstoff**

Siliziumdioxid / Kieselgur 100 g/100 g (CAS 61790–53–2)

## **Anwendung**

**Trockene Anwendung:** Gallo-Sec mit einem Stäubegerät gleichmäßig im trockenen Stall verteilen. Wichtig ist die Behandlung der potenziellen Verstecke der Vogelmilben (Ritzen, Schlitzte, Verschraubungen, Unterseiten von Sitzstangen, unter Abdeckungen etc.). **Flüssige Anwendung:** Wir empfehlen 1,5–2 dl Gallo-Sec in 1 Liter Wasser zu mischen und mit einem Handsprühgerät oder einer Rückenspritze auszubringen. Um hartnäckige Ablagerungen im Gerät zu vermeiden, sollte die Mischung immer wieder gerührt oder geschüttelt werden. Sobald keine Gallo-Sec Ablagerungen mehr sichtbar sind, die Anwendung wiederholen. Bei starkem Befall die Anwendung wöchentlich wiederholen. Die stark betroffenen Stellen müssen nach maximal 2 Tagen kontrolliert und erneut behandelt werden. Für eine rasche Dezimierung der Vogelmilbe kann vor der Gallo-Sec Behandlung ein schnell wirkendes biologisches Kontaktinsektizid (z.B. Bio-Phalanx-Insektenspray) eingesetzt werden. Kann im leeren und belegten Stall angewendet werden.

## **Dosierung**

30 g–50 g Gallo-Sec pro m<sup>2</sup>, je nach Befallsstärke und Verschmutzungsgrad.

## **Vorsichtsmassnahmen**

Staub nicht einatmen. Für gute Raumlüftung sorgen. Bei starker Staubentwicklung ist das Tragen einer partikelfiltrierenden Schutzmaske (z.B. FFP3) notwendig. Augen- und Hautkontakt möglichst vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Teileinleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle übergeben.

## **Haltbarkeit**

Ab Herstellungsdatum bei trockener Lagerung mindestens 5 Jahre haltbar.

## **UFI / Biozid-Zulassungsnummer**

M300-POFGf-KOOE-G91C / CHZB1846

## **Hersteller / Fabricant**

Biofa GmbH, DE-Münsingen

## **Charge und Produktionsdatum**

Siehe Aufdruck

**Gemäss FiBL-Betriebsmitteliste für den biologischen Landbau in der Schweiz zugelassen.**

## **fr-CH Propriétés/Effets**

Acaricide et insecticide contre la lutte biologique de vermine rampante, essentiellement le pou rouge (*Dermanyssus gallinae*) dans les poulaillers. Gallo-Sec est une poudre à base de diatomée fossile (= coques d'algues siliceuses fossiles). Les parasites, tels que les poux rouges dans les élevages de volailles par exemple, mais également les nuisibles rampants, tels que cloportes, fourmis et autres, se couvrent eux-mêmes de poudre par suite de leur propre activité, ou bien sont saupoudrés lors de l'application. La substance active entraîne l'élimination des graisses de la cuticule et la déshydratation des insectes.

## **Matière active**

Dioxyde de silicium / Kieselguhr 100 g/100 g (CAS 61790–53–2)

## **Utilisation**

**Utilisation à sec:** Étalez à sec à l'aide d'une saupoudreuse Gallo-Sec dans le poulailler. Il est important de traiter les cachettes des poux rouges (fentes, fissures, raccords vissés, les dessous des perchoirs et sous les recouvrements etc.). **Utilisation liquide:** Nous recommandons de mélanger Gallo-Sec avec de l'eau, 1 litre d'eau pour 1,5–2 dl de Gallo-Sec qui peut être appliquée à l'aide d'un vaporisateur manuel ou d'un pulvérisateur dorsale. Afin d'éviter des dépôts réfractaires dans l'appareil, il est important de secouer régulièrement la solution. Dès que les dépôts de Gallo-Sec ne sont plus visibles, renouveler l'opération. Lors d'une forte infestation reconduire hebdomadairement le traitement. Les endroits fortement infestés doivent être vérifiés tous les 2 jours, renouveler le traitement si nécessaire. Avant d'utiliser Gallo-Sec et pour accélérer la décimation de la population des poux rouges, il est possible de traiter avec un insecticide de contact biologique (par ex. Bio-Phalanx Spray insecticide). Peut-être utilisé dans les poulaillers vides ou occupés.

## **Dosage**

30 g à 50 g Gallo-Sec par m<sup>2</sup>, selon le degré d'infestation et salubrité.

## **Mesures de précautions**

Ne pas aspirer la poussière. Veillez à une bonne aération des locaux. Par fort nuage de poussière, il est indispensable de porter un masque de protection filtrant les particules (par ex. FFP3). Les contacts oculaires et cutanés sont à limiter. Conserver hors de la portée des enfants. Rapportez les récipients entamés au point de vente ou dans un centre de collecte pour déchets.

## **Conservation**

Stocké dans un endroit sec pendant au moins 5 ans à compter de la date de production.

## **UFI / Numéro d'homologation de biocide**

M300-POFGf-KOOE-G91C / CHZB1846

## **Hersteller / Fabricant**

Biofa GmbH, DE-Münsingen

## **Lot et date de production**

Voir couvercle

**Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants FiBL.**

